

人類乳突病毒疫苗接種後應注意事項

接種後注意事項：

- 四價人類乳突病毒疫苗共需接種三劑。須以肌肉注射方式施打每劑**0.5**毫升的劑量：第一劑：一個選定的日期；第二劑：第一劑的**2**個月後；第三劑：第一劑的**6**個月後。
- 血友病或血小板減少症患者、懷孕婦女不建議接種。
- 接種後應於接種現場留置觀察三十分鐘，確認無任何不適症狀後才離開。
- 接種後，請多喝水、多休息。如遇特殊反應時應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處置。
- 接種紀錄卡請家長妥善保存，供每次接種紀錄之用。
- 接種疫苗後，雖可降低罹患子宮頸癌的機會，但仍有可能罹患子宮頸癌。民眾仍須定期進行子宮頸抹片檢查，以維護身體健康。

人類乳突病毒疫苗接種後可能發生的反應：

- 本次接種使用的為四價人類乳突病毒(HPV)疫苗，含**第6、11、16及18**基因型類病毒微粒。安全性符合美國、歐洲、澳洲、台灣等世界各國衛生主管機關的認可，其常見的不良反應為注射部位疼痛、紅腫、以及眩昏、頭痛、疲倦，發燒等；不良反應多為輕到中度，一般而言會自行緩解。
- 接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應如氣喘、呼吸困難、抽蓄等不適症狀，應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處置。

四價人類乳突病毒疫苗的保護效果：

- 接種四價人類乳突病毒疫苗可幫助預防由**第6、11、16、18**型人類乳突病毒所引起的病變：子宮頸癌、生殖器疣、**第2、3級**外陰上皮內贅瘤、**第2、3級**陰道上皮內贅瘤、子宮頸癌上皮內贅瘤。

人類乳突病毒(HPV)疫苗諮詢專線：**0809-015-586**