

人類乳突病毒疫苗接種後應注意事項

接種後注意事項：

- ◎ 四價人類乳突病毒疫苗共需接種三劑，每劑須以肌肉注射方式施打每劑 0.5 毫升的劑量。
- ◎ 四價人類乳突病毒疫苗建議接種時程為：第一劑：一個選定的日期；接種第一劑的2個月後；第三劑：接種第一劑的6個月後。
- ◎ 血友病或血小板減少症患者、懷孕婦女不建議接種。
- ◎ 接種後應於接種現場留置觀察三十分鐘，確認無任何不適症狀後才離開。
- ◎ 接種後，請多喝水、多休息。如遇特殊反應時應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處置。
- ◎ 接種紀錄卡請家長妥善保存，供每次接種紀錄之用。
- ◎ 接種疫苗後，雖可降低罹患子宮頸癌的機會，但仍有可能罹患子宮頸癌。民眾仍須定期進行子宮頸抹片檢查，以維護身體健康。

人類乳突病毒疫苗接種後可能發生的反應：

- ◎ 本次接種使用的為四價人類乳突病毒(HPV)疫苗，含第6、11、16、18基因型類病毒微粒。安全性符合美國、歐洲、澳洲、台灣等世界各國衛生主管機關的認可。常見的不良反應為注射部位疼痛、紅腫、以及眩昏、頭痛、疲倦，發燒等。不良反應多為輕到中度，一般而言會自行緩解。
- ◎ 接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應如氣喘、呼吸困難、抽蓄等不適症狀，應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處置。

四價人類乳突病毒疫苗的保護效果：

- ◎ 接種四價人類乳突病毒疫苗可幫助預防由第6、11、16、18型人類乳突病毒所引起的病變：子宮頸癌、子宮頸原位腺癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌以及相關的癌前病變、生殖器疣(菜花)等。

人類乳突病毒 (HPV) 疫苗諮詢專線： 0809 - 015 - 586